

Terminarz oprysków brzoskwini

Choroba lub szkodnik	Profilaktyka	Opryski naturalne i ekologiczne	Opryski środkami ochrony roślin
Okres bezlistny			
Kędzierzawość liści brzoskwini	Obserwować pąki brzoskwini już pod koniec lutego. Wykonać opryski w okresie nabrzmiewania pąków, tuż przed ich pękaniem	Wyciąg ze skrzypu polnego (1:5), wywar ze skrzypu polnego (1:4) lub gotowy preparat ze skrzypu EVASIOŁ	Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC, Syllit 65 WP
Czerwce, mszyce, przędziorki	Opryskiwać drzewa w fazie pęknięcia pąków celem zniszczenia szkodników zimujących na roślinie	Emulpar 940 EC, Treol 770 EC, Siltac EC.	
Przed kwitnieniem			
Kędzierzawość liści brzoskwini			Syllit 65 WP Stosować w okresie od fazy pęknięcia pąka do opadnięcia płatków
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych	Usuwanie porażonych owoców. Wykonanie cięcia prześwietlającego korony.	Opryskiwać wyciągiem z krwawnika (1:10) po stwierdzeniu objawów choroby	Signum 33 WP
Mączniak prawdziwy	Usuwanie porażonych pędów	Opryskiwać wyciągiem z krwawnika (1:10), wyciągiem z mniszka (bez rozcieńczania) lub preparatami Evasiol oraz Limocide	Siarkol 800 SC Siarkol 80 WG
Mszyce		Siltac EC Emulpar 940 EC Wywar lub napar z krwawnika (bez rozcieńczenia)	Mospilan 20 SP
Zwojówki i inne gąsienice zjadające liście		Wywar lub napar z krwawnika (bez rozcieńczania), Wyciąg z rumianku (1:5)	Mospilan 20SP
Kwitnienie			
Kędzierzawość liści brzoskwini		Wyciąg z krwawnika (1:10)	
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych	Usuwanie porażonych owoców. Wykonanie cięcia prześwietlającego korony.	Wyciąg z krwawnika (1:10)	Switch 62,5 WG
Po kwitnieniu, wzrost owoców			
(z zachowaniem okresu karencji dla danego środka)			
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych	Usuwanie porażonych owoców	Wyciąg z krwawnika (1:10)	Switch 62,5 WG; Signum 33 WP
Mączniak prawdziwy	Usuwanie porażonych pędów i liści	Wyciąg z krwawnika (1:10); Evasiol, Limocide	Siarkol 800 SC, Siarkol 80 WG
Mszyce	Oprysk po stwierdzeniu obecności szkodników	Siltac EC, Emulpar 940 EC, wyciąg z mniszka lekarskiego (bez rozcieńczania, oprysk powtarzać co 2 tygodnie)	Mospilan 20 EC (oprysk po opadnięciu płatków kwiatowych)
Szpeciele, przędziorki	Oprysk po stwierdzeniu obecności szkodników	Siltac EC, Emulpar 940 EC, wyciąg z mniszka lub pokrzywy (bez rozcieńczania, oprysk powtarzać co 2 tygodnie)	Mospilan 20 EC

Skośnik brzoskwiniaczek	Warto zastosować tablice feromonowe	Lepinox Plus - stosować w okresie żerowania gąsienic na liściach, zanim zwiną liście	
Czerwce	Oprysk po stwierdzeniu obecności szkodników	Siltac EC, Emulpar 940 EC	
Zwojówki i inne gąsienice zjadające liście	Oprysk po stwierdzeniu obecności szkodników	Wywar lub napar z krwawnika (bez rozcieńczania); Wywar z liści i pędów pomidora (1:4)	Mospilan 20 EC
Opadanie liści			
Kędzierzawość liści brzoskwini	Oprysk po zbiorach od momentu gdy 50% liści opadło		Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC, Syllit 65 WP

Więcej: [Opryski brzoskwini. Kiedy i czym przyskać brzoskwini?](#)

Zamów polecane preparaty: [środki do oprysku brzoskwini](#)

PoradnikOgrodnicy.pl
Twój Ogród Piękny i Zdrowy