

TERMINARZ OPRYSKÓW JABŁONI

Choroba lub szkodnik	Profilaktyka	Opryski naturalne i ekologiczne	Opryski środkami ochrony roślin
OKRES BEZLISTNY (STYCZEŃ-LUTY)			
rak, zgorzel kory			Topsin M 500 SC (15g na 7,5l wody)
parch jabłoni	odpowiednio formować korony drzew, co zapobiega ich nadmiernemu zagęszczeniu i utrzymywaniu się wilgoci	wyciąg z krwawnika pospolitego (w rozcieńczeniu 1:10)	
OKRES NABRZMIEWANIA PĄKÓW (LUTY- MARZEC)			
szkodniki jabłoni	oprysk preparatami zawierającymi olej parafinowy niszczący zimujące stadia szkodników	Emulpar 940 EC (90-120 ml na 10 l wody), Promanal 60 EC (20 ml na litr wody)	
mączniak jabłoni	usuwać pędy ze srebrzystą zimującą grzybnią, a przed kwitnieniem wycinać pędy z widocznymi objawami choroby	tuż przed pękaniem pąków rozpocząć opryski preparatem Lecitec co 5 dni (25 ml na 8 l wody)	Siarkol Extra 80 WP (75g na 6 l wody) lub Siarkol 800 SC (60 - 75 ml w 6 l wody)
zaraza ogniowa	odkazać narzędzia w czasie cięcia drzew		Miedzian 50 WP (1,5g na 0,75 l wody), Miedzian Extra 350 SC (1,5 ml na 0,75 l wody)
OKRES PĘKANIA PĄKÓW (MARZEC)			
kwieciak jabłoniowiec	w ciepłe dni wytrząsać kwieciaka z drzewa na płachtę, po kwitnieniu należy zbierać i niszczyć opanowane pąki	wywar z wrotycza pospolitego (1:5)	Deltam (7,5ml na 7 l wody)
zaraza ogniowa	w początkowym okresie występowania choroby wycinać porażone fragmenty koron		Miedzian 50 WP (1,5g na 0,75 l wody), Miedzian Extra 350 SC (1,5 ml na 0,75 l wody)
parch jabłoni	uprawiać odmiany odporne, prześwietlać rośliny, usuwać opadłe liście	opryskiwanie wyciągiem ze skrzypu	Syllit 65WP (10g na 15l wody)
OKRES UKAZYWANIA SIĘ PIERWSZYCH LIŚCI (MARZEC-KWIECIEŃ)			
parch jabłoni	uprawiać odmiany odporne, prześwietlać rośliny, usuwać opadłe liście	opryskiwanie wyciągiem ze skrzypu	Miedzian 50 WP (1,5g na 0,75 l wody), Miedzian Extra 350 SC (1,5 ml na 0,75 l wody) lub Magnicur Gold + Antracol 70WG (1,5g+15g na 7,5l wody)
mączniak jabłoni		wycinać porażone pędy, opryskiwać wyciągiem z krwawnika (1:10) lub preparatem Limocide (28 ml na 7 l wody), wykonać 2-3 opryski w odstępach co 7 dni; Uwaga: oprysk Limocide zabezpiecza też przed miodówką jabłoniową	Siarkol Extra 80 WP (75g na 6 l wody) lub Siarkol 800 SC (60 - 75 ml w 6 l wody)
ZIELONY PĄK KWIATOWY (KWIECIEŃ - MAJ)			
bawełnica korówka	usuwać i niszczyć pędy z objawami uszkodzeń spowodowanymi żerowaniem szkodnika		Mospilan 20 SP (2,0 g na 9l wody)

parcz jabłoni		opryskiwanie wyciągiem ze skrzypu	Miedzian 50 WP (1,5g na 0,75 l wody), Miedzian Extra 350 SC (1,5 ml na 0,75 l wody)
RÓŻOWY PĄK KWIATOWY (MAJ)			
toczyk gruszoziacek	usuwać i niszczyć pędy z objawami uszkodzeń spowodowanymi żerowaniem szkodnika		Mospilan 20 SP (1,25g na 9l wody)
owocnica jabłkowa	wykrywanie obecności owocnicy za pomocą białych tablic lepowych	wyciąg z wrotycza pospolitego (1:2)	Mospilan 20 SP (2g na 9l wody)
KWITNIENIE (MAJ)			
parcz jabłoni	średnio raz na dwa tygodnie przeprowadzać lustrację sadu, szczególną uwagę zwracać na odmiany podatne i wcześniej rozpoczynające wegetację	opryskiwanie wywarem ze skrzypu polnego (1:4) lub preparatem EVASIOŁ (50ml na 5 l wody), powtarzać co 10-15 dni	Magnicur Gold +Antracol 70WG (1,5g+15g na 7,5l wody)
mączniak jabłoni	kontynuować wycinanie pędów i kwiatostanów z objawami mączniaka	opryski preparatem EVASIOŁ (50ml na 5 l wody), powtarzać co 10-15 dni	Siarkol Extra 80 WP (75g na 6 l wody) lub Siarkol 800 SC (60 - 75 ml w 6 l wody)
zaraza ogniowa	w okresie opadania płatków rozpocząć lustrację sadu		Miedzian 50 WP (1,5g na 0,75 l wody), Miedzian Extra 350 SC (1,5 ml na 0,75 l wody)
OKRES ROZWOJU ZAWIĄZKÓW (CZERWIEC-LIPIEC)			
parcz jabłoni	kontynuacja lustracji sadu	opryskiwanie wywarem ze skrzypu polnego (1:4) lub preparatem EVASIOŁ (50ml na 5 l wody), powtarzać co 10-15 dni	Polyram 70 WG (26g na 7,5l wody)
mączniak jabłoni		odwar ze skrzypu, opryski preparatem Lecitec (25 ml na 8 l wody), powtarzać co 5 dni	Siarkol Extra 80 WP (75g na 6 l wody) lub Siarkol 800 SC (60 - 75 ml w 6 l wody)
bawełnica korówka	bawełnica korówka jest skutecznie ograniczana przez ośca korówkowego (<i>Aphelinus mali</i>) pasożyta bawełnicy		Mospilan 20 SP (2g na 9l wody)
owocówka jabłkóweczka	zwalczanie należy ustalić na podstawie stopnia opanowania w poprzednim roku za pomocą tablic lepowych	zawiesić pułapki feromonowe zawiesić na drzewach, gąsienice wyłapywać za pomocą opasek z papieru falistego zakładanych na pniu drzew	Mospilan 20 SP (2g na 9l wody)
miodówka jabłoniowa	opryski po zauważeniu obecności szkodnika	oprysk preparatem Limocide (28 ml na 7 l wody) w odstępach co 7 dni, można kontynuować aż do fazy dojrzałości owoców, maksymalnie 6 oprysków w sezonie wegetacyjnym	
OKRES WZROSTU OWOCÓW (SIERPIEŃ-WRZESIEŃ)			
parcz jabłoni	kontynuować lustrację sadu	opryskiwać odwarem ze skrzypu polnego (1:4)	
mączniak jabłoni	kontynuować lustrację sadu	obrywanie porażonych liści, opryskiwać wyciągiem z krwawnika	

zaraza ogniowa	kontynuować lustracje sadu, usuwać porażone pędy z 30 cm zapasem, zabezpieczać rany po cięciu		Miedzian 50 WP (1,5g na 0,75 l wody), Miedzian Extra 350 SC (1,5 ml na 0,75 l wody)
PO ZBIORACH (PAŹDZIERNIK-LISTOPAD)			
parch jabłoni		oprysk 5% roztworem mocznika w okresie opadania liści z drzew	

Tu zamówisz polecane preparaty do oprysku jabłoni:

sklep.PoradnikOgrodnicy.pl

PoradnikOgrodnicy.pl
Twój Ogród Piękny i Zdrowy