

Byliny wabiące motyle			
Nazwa gatunku	Wysokość (cm)	Stanowisko	Termin kwitnienia
Aster (<i>Aster</i>) - różne gatunki i odmiany	20-130	słoneczne	VIII-X
Bodziszek (<i>Geranium</i>) - różne gatunki i odmiany	10-70	słoneczne do cienistego	V-IX
Chaber górski (<i>Centaurea montana</i>)	45	słoneczne	V-VI
Dyptam jesionolistny (<i>Dictamnus albus</i>)	do 120	słoneczne	VI-VII
Firletka kwiecista (<i>Lychnis coronaria</i>)	do 90	słoneczne	VII-VIII
Floks szydlasty (<i>Phlox subulata</i>)	do 15	słoneczne	IV-V
Floks wiechowaty (<i>Phlox paniculata</i>)	do 100	słoneczne	VII-VIII
Jeżówka purpurowa (<i>Echinacea purpurea</i>)	30-100	słoneczne	VII-IX
Jeżyna arktyczna (<i>Rubus arcticus</i>)	do 20	słoneczne do półcienistego	V
Kłosowiec (<i>Agastache</i>)	60-100	słoneczne do półcienistego	VII-IX
Kocimiętka Faassena (<i>Nepeta x faassenii</i>)	do 30	słoneczne	V-IX
Krwawnica pospolita (<i>Lythrum salicaria</i>)	50-70	słoneczne do półcienistego	VII-VIII
Lebiodka pospolita (<i>Origanum vulgare</i>)	20-50	słoneczne	VII-IX
Liatra kłosowa (<i>Liatris spicata</i>)	do 70	słoneczne	VII-IX
Macierzanka (<i>Thymus</i> sp.) - różne gatunki i odmiany	do 30	słoneczne	VI-VII
Pierwiosnek (<i>Primula</i>)	do 30	słoneczne do półcienistego	IV-V
Przegorzan pospolity (<i>Echinops</i>)	do 100	słoneczne	VI-VIII
Rozchodnik okazały (<i>Sedum spectabile</i>)	do 50	słoneczne	VIII-X
Serduszka okazałe (<i>Dicentra spectabilis</i>)	60-100	półcieniste	V-VI
Smotrawa okazała (<i>Telekia Speciosa</i>)	do 200	słoneczne do półcienistego	VII-IX
Szałwia omszona (<i>Salvia nemorosa</i>)	40-80	słoneczne	VI-IX
Trojeść bulwiasta (<i>Asclepias tuberosa</i>)	60-100	słoneczne	VI-VIII
Żagwin ogrodowy (<i>Aubrieta x cultorum</i>)	5	słoneczne	IV-VI

Kwiaty jednoroczne wabiące motyle			
Nazwa gatunku	Wysokość (cm)	Stanowisko	Termin kwitnienia
Aksamitka (<i>Tagetes</i>) - różne gatunki	do 100	słoneczne	V-XI
Aster chiński (<i>Callistephus chinensis</i>)	do 100	słoneczne	VII-X
Cynia (<i>Zinnia</i>)	do 100	słoneczne	V-X
Czarnuszka damasceńska (<i>Nigella damascena</i>)	do 70	słoneczne	VI-VIII
Driakiew purpurowa (<i>Scabiosa atropurpurea</i>)	do 90	słoneczne do półcienistego	VII-XI
Kosmos/onętek (<i>Cosmos bipinnatus</i>)	do 120	słoneczne	VII-XI
Lak (<i>Cheiranthus cheiri</i>)	40-60	słoneczne	VI-VIII
Lewkonia letnia (<i>Matthiola incana</i>)	do 60	słoneczne	VI-VII
Maciejka (<i>Matthiola longipetala</i>)	do 40	słoneczne	VI-VII
Nasturcja (<i>Tropaeolum</i>)	do 300	słoneczne do półcienistego	VI-XI
Rezeda wonna (<i>Reseda odorata</i>)	30-40	słoneczne do półcienistego	VII-X
Rudbekia dwubarwna (<i>Rudbeckia hirta</i>)	90-100	słoneczne	VII-X
Słonecznik zwyczajny (<i>Helianthus annuus</i>)	do 350	słoneczne	VII-X
Smagliczka nadmorska (<i>Lobularia maritima</i>)	do 15	słoneczne	VI-X
Tytoń skrzydlaty (<i>Nicotiana glauca</i>)	do 150	słoneczne	VII-X
Werbena patagońska (<i>Verbena bonariensis</i>)	do 150	słoneczne	VII-XI
Żeniszek meksykański (<i>Ageratum houstonianum</i>)	12-60	słoneczne	V-XI

Krzewy wabiące motyle			
Nazwa gatunku	Wysokość (cm)	Stanowisko	Termin kwitnienia
Barbula klandońska (<i>Caryopteris clandonensis</i>)	do 100	słoneczne	VIII-X
Budleja Davida (<i>Buddleja davidii</i>) - wszystkie odmiany	do 300	słoneczne	VI-X
Budleja Weyera (<i>Buddleja x weyeriana</i>)	do 200	słoneczne	VI-X
Jeżyna	do 250	słoneczne	V-VI
Lawenda (<i>Lavandula</i>) - różne gatunki	do 80	słoneczne	VI-IX
Lilak Meyera 'Palibin' (<i>Syringa meyeri</i>)	do 150	słoneczne do półcienistego	V-VI
Lilak pospolity (<i>Syringa vulgaris</i>) - wszystkie odmiany	300-400	słoneczne do półcienistego	V
Malina (<i>Rubus</i>)	do 200	słoneczne	V-VIII
Porzeczka krwista (<i>Ribes sanguineum</i>)	do 200	słoneczne	IV-V
Róża pomarszczona (<i>Rosa rugosa</i>)	do 150	słoneczne	IV-VIII
Suchodrzew Maacka (<i>Lonicera maackii</i>)	do 400	od słonecznego do cienistego	VI
Suchodrzew tatarski (<i>Lonicera tatarica</i>)	200-300	słoneczne do półcienistego	V-VI
Wierzba iwa (<i>Salix caprea</i>)	do 250	słoneczne	III-IV
Wrzosiec krwisty (<i>Erica carnea</i>)	do 25	słoneczne do półcienistego	I-V
Żylister (<i>Deutzia</i>) - różne gatunki	do 300	słoneczne do półcienistego	V-VIII

Pnącza wabiące motyle			
Nazwa gatunku	Wysokość (cm)	Stanowisko	Termin kwitnienia
Mięszojad dahurski (<i>Menispermum davuicum</i>)	do 500	słoneczne do półcienistego	V-VI
Wiciokrzew Browna (<i>Lonicera x brownii</i>)	do 300	słoneczne	VI-IX
Wiciokrzew Henryiego (<i>Lonicera henryi</i>)	do 300	półcieniste	VI-VII
Wiciokrzew pomorski (<i>Lonicera periclymenum</i>)	do 600	słoneczne do półcienistego	VI-X
Wiciokrzew przewiercień (<i>Lonicera caprifolium</i>)	do 300	słoneczne do półcienistego	V-VI
Wiciokrzew Tellmanna (<i>Lonicera x tellmanniana</i>)	do 500	słoneczne do półcienistego	VI-VII
Wiciokrzew zaostrowy (<i>Lonicera acuminata</i>)	do 400	słoneczne do półcienistego	VI-X

Więcej: [Motyle w ogrodzie. Kwiaty i krzewy wabiące motyle](#)