

Terminarz oprysków brzoskwini

Choroba lub szkodnik	Profilaktyka	Opryski naturalne i ekologiczne	Opryski środkami ochrony roślin
Okres bezlistny			
Kędzierzawość liści brzoskwini	Obserwować pąki brzoskwini już pod koniec lutego. Wykonać opryski w okresie nabrzmiewania pąków, tuż przed ich pękaniem	Wyciąg ze skrzypu polnego (1:5), wywar ze skrzypu polnego (1:4) lub gotowy preparat ze skrzypu Lykos	Syllit 65 WP (dawniej stosowano też Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC ale użycie to zostało usunięte z etykiety środka)
Czerwce, mszyce, przędziorki	Opryskiwać drzewa w fazie pęknięcia pąków celem zniszczenia szkodników zimujących na roślinie	Emulpar 940 EC, Treol 770 EC, Siltac EC.	
Przed kwitnieniem			
Kędzierzawość liści brzoskwini			Syllit 65 WP Stosować w okresie od fazy pęknięcia pąka do opadnięcia płatków
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych	Usuwanie porażonych owoców. Wykonanie cięcia prześwietlającego korony.	Opryskiwać wyciągiem z krwawnika (1:10) po stwierdzeniu objawów choroby	Signum 33 WG
Mączniak prawdziwy	Usuwanie porażonych pędów	Opryskiwać wyciągiem z krwawnika (1:10), wyciągiem z mniszka (bez rozcieńczania) lub preparatami Lykos oraz Limocide	Siarkol 800 SC Siarkol 80 WG
Mszyce		Siltac EC Emulpar 940 EC Wywar lub napar z krwawnika (bez rozcieńczania), opryski mydłem potasowym o zapachu czosnku	
Zwojówki i inne gąsienice zjadające liście		Wywar lub napar z krwawnika (bez rozcieńczania), Wyciąg z rumianku (1:5)	
Kwitnienie			
Kędzierzawość liści brzoskwini		Wyciąg z krwawnika (1:10), wyciąg ze skrzypu polnego (1:5), wywar ze skrzypu polnego (1:4) lub gotowy preparat ze skrzypu Lykos	
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych	Usuwanie porażonych owoców. Wykonanie cięcia prześwietlającego korony.	Wyciąg z krwawnika (1:10)	Switch 62,5 WG
Po kwitnieniu, wzrost owoców			
(z zachowaniem okresu karencji dla danego środka)			
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych	Usuwanie porażonych owoców	Wyciąg z krwawnika (1:10)	Switch 62,5 WG; Signum 33 WG
Mączniak prawdziwy	Usuwanie porażonych pędów i liści	Wyciąg z krwawnika (1:10); Lykos, Limocide	Siarkol 800 SC, Siarkol 80 WG
Mszyce	Oprysk po stwierdzeniu obecności szkodników	Siltac EC, Emulpar 940 EC, wyciąg z mniszka lekarskiego (bez rozcieńczania, oprysk powtarzać co 2 tygodnie), oprysk mydłem potasowym o zapachu czosnku	

Szpeciele, przędziorki	Oprysk po stwierdzeniu obecności szkodników	Siltac EC, Emulpar 940 EC, wyciąg z mniszka lub pokrzywy (bez rozcieńczania, oprysk powtarzać co 2 tygodnie)	
Skośnik brzoskwiniaczek	Warto zastosować tablice feromonowe	Lepinox Plus - stosować w okresie żerowania gąsienic na liściach, zanim zwiną liście	
Czerwce	Oprysk po stwierdzeniu obecności szkodników	Siltac EC, Emulpar 940 EC	
Zwojówki i inne gąsienice zjadające liście	Oprysk po stwierdzeniu obecności szkodników	Wywar lub napar z krwawnika (bez rozcieńczania); Wywar z liści i pędów pomidora (1:4)	
Opadanie liści			
Kędzierzawość liści brzoskwini	Oprysk 5% roztworem mocznika po zbiorach, od momentu gdy 50% liści opadło		Syllit 65 WP (dawniej stosowano też Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC ale użycie to zostało usunięte z etykiety środka)

[Więcej: Opryski brzoskwini. Kiedy i czym przyskać brzoskwini?](#)

[Zamów polecane preparaty: środki do oprysku brzoskwini](#)

PoradnikOgrodnicy.pl
Twój Ogród Piękny i Zdrowy