

## TERMINARZ OPRYSKÓW ŚLIWY

Choroba lub szkodnik	Profilaktyka	Opryski naturalne i ekologiczne	Opryski środkami ochrony roślin
<b>OKRES NABRZMIEWANIA PĄKÓW (LUTY- MARZEC)</b>			
szkodniki śliwy	oprysk preparatami zawierającymi olej parafinowy niszczący zimujące stadia szkodników	<b>Emulpar 940 EC</b> (90-120 ml na 10 l wody), <b>Promanal 60 EC</b> (20 ml na litr wody)	
choroby kory i drewna leukostomoza	zapobieganie uszkodzeniom mrozowym, zabezpieczanie ran, usuwanie porażonych pędów, karczowanie i palenie silnie porażonych drzew		smarować maścią ogrodniczą np.. <b>Funaben Plus 03 PA</b> miejsca po cięciu lub po powstaniu rany
<b>PRZED KWITNIENIEM (KWIECIEŃ)</b>			
mszyce	usuwanie i niszczenie zasiedlonych przez mszyce pędów zmniejsza liczebność populacji	opryski z pokrzywy, czosnku, cebuli	<b>Mospilan 20 SP</b> (1,25g na 9l wody)
misecznik śliwowy	usuwanie pędów zaatakowanych przez szkodniki		<b>Mospilan 20 SP</b> (2g na 2-7,5l wody)
zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście	dbanie o bioróżnorodność roślin w sadzie i otoczeniu sprzyja zwiększeniu liczebności drapieżców i pasożytów		<b>Mospilan 20 SP</b> (2g na 2-7,5l wody)
przędziorek owocowiec	drapieżne roztocze z rodziny <i>Phytoseiidae</i> , drapieżne pluskwiaki z rodziny dziubałkowatych i tasznikowatych, chrząszcze m.in. skulik przędziorkowiec		<b>Ortus 05 SC</b> (10ml na 5-10l wody)
brunatna zgnilizna drzew pestkowych	usuwanie porażonych pędów i mumii owoców	opryskiwanie wywarem (1:4) ze skrzypu polnego lub preparatem <b>EVASIOIOL</b> opartym na skrzypie polnym (50ml na 5 l wody), powtarzać co 10-15 dni	<b>Topsin M 500 SC</b> (15ml na 7,5 l wody)
dziurkowatość liści drzew pestkowych	wycinanie silnie porażonych pędów	wyciąg z krwawnika lub odwar ze skrzypu oraz gnojówka, wywar, napar bez rozcieńczenia ze chrzanzu pospolitego	<b>Zato 50 WG</b> lub <b>Magnicur Gold 50 WG</b> (1,5g na 7,5 l wody)
<b>KWITNIENIE (MAJ)</b>			
dziurkowatość liści drzew pestkowych	systematycznie usuwać porażone pędy	wyciąg z krwawnika lub odwar ze skrzypu oraz gnojówka, wywar, napar bez rozcieńczenia ze chrzanzu pospolitego	<b>Topsin M 500 SC</b> (15ml na 7,5 l wody), <b>Zato 50 WG</b> lub <b>Magnicur Gold 50 WG</b> (1,5g na 7,5 l wody)
rdza śliwy	w pobliżu sadów niszczyć zawilca żółtego, drugiego żywiciela sprawcy rdzy śliwy		<b>Zato 50 WG</b> lub <b>Magnicur Gold 50 WG</b> (1,5g na 7,5 l wody)
<b>PO KWITNIENIU (CZERWIEC)</b>			
zwójkówki liściowe	duże znaczenie w ograniczaniu odgrywa kruszynek, który jest pasożytem zimujących jaj szkodnika		<b>Mospilan 20 SP</b> (2g na 2-7,5l wody)

przędziorek owocowiec	drapieżne roztocze z rodziny <i>Phytoseiidae</i> , drapieżne pluskwiaki z rodziny dziubałkowatych i tasznikowatych, chrząszcze m.in. skulik przędziorkowiec		<b>Ortus 05 SC</b> (10ml na 5-10l wody)
mszyce	usuwanie i niszczenie zasiedlonych przez mszyce pędów zmniejsza liczebność populacji	opryski z pokrzywy, czosnku, cebuli	<b>Mospilan 20 SP</b> (1,25g na 9l wody)
porzewiacz śliwowy	warto wprowadzać do sadu naturalnych wrogów szpecieli jak drapieżne roztocze z rodziny <i>Phytoseiidae</i>		<b>Ortus 05 SC</b> (15ml na 5-10l wody)
choroby kory i drewna leukostomoza	zapobieganie uszkodzeniom mrozowym, zabezpieczanie ran, usuwanie porażonych pędów, karczowanie i palenie silnie porażonych drzew		smarować maścią ogrodniczą np.. <b>Funaben Plus 03 PA</b> miejsca po cięciu lub po powstaniu rany
dziurkowatość liści drzew pestkowych	systematycznie usuwać porażone pędy	wyciąg z krwawnika lub odwar ze skrzypu oraz gnojówka, wywar, napar bez rozcieńczenia ze chrzanu pospolitego	<b>Topsin M 500 SC</b> (15ml na 7,5 l wody) lub <b>Zato 50 WG</b> lub <b>Magnicur Gold 50 WG</b> (1,5g na 7,5 l wody)
rdza śliwy	w pobliżu sadów niszczyć zawilca żółtego, drugiego żywiciela sprawcy rdzy śliwy		<b>Zato 50 WG</b> lub <b>Magnicur Gold 50 WG</b> (1,5g na 7,5 l wody)
brunatna zgnilizna drzew pestkowych	usuwanie porażonych pędów i mumii owoców	opryskiwanie wywarem (1:4) ze skrzypu polnego lub preparatem <b>EVASIO</b> opartym na skrzypie polnym (50ml na 5 l wody), powtarzać co 10-15 dni	<b>Topsin M 500 SC</b> (15ml na 7,5 l wody)
<b>OKRES WZROSTU OWOCÓW (CZERWIEC)</b>			
przędziorek owocowiec	drapieżne roztocze z rodziny <i>Phytoseiidae</i> , drapieżne pluskwiaki z rodziny dziubałkowatych i tasznikowatych, chrząszcze m.in. skulik przędziorkowiec		<b>Ortus 05 SC</b> (10ml na 5-10l wody)
porzewiacz śliwowy	wprowadzać do sadu naturalnych wrogów szpecieli jak drapieżne roztocze z rodziny <i>Phytoseiidae</i>		<b>Ortus 05 SC</b> (15ml na 5-10l wody)
owocówka śliwkóweczka	stosowanie pułapek z feromonami		<b>Mospilan 20 SP</b> (2g na 5-9l wody)
dziurkowatość liści drzew pestkowych	systematycznie usuwać porażone pędy	wyciąg z krwawnika lub odwar ze skrzypu oraz gnojówka, wywar, napar bez rozcieńczenia ze chrzanu pospolitego	<b>Topsin M 500 SC</b> (15ml na 7,5 l wody) lub <b>Zato 50 WG</b> lub <b>Magnicur Gold 50 WG</b> (1,5g na 7,5 l wody)
brunatna zgnilizna drzew pestkowych	usuwanie porażonych pędów i mumii owoców	opryskiwanie wywarem (1:4) ze skrzypu polnego lub preparatem <b>EVASIO</b> opartym na skrzypie polnym (50ml na 5 l wody), powtarzać co 10-15 dni	<b>Switch 62,5 WG</b> (6-10g na 6-15l wody)

rdza śliwy	w pobliżu sadów niszczyć zawilca żółtego, drugiego żywiciela sprawcy rdzy śliwy		<b>Zato 50 WG lub Magnicur Gold 50 WG (1,5g na 7,5 l wody)</b>
<b>OKRES DOJRZEWANIA OWOCÓW (LIPIEC-SIERPIEŃ)</b>			
przędziorek owocowiec	drapieżne roztocze z rodziny <i>Phytoseiidae</i> , drapieżne pluskwiaki z rodziny dziubałkowatych i tasznikowatych, chrząszcze m.in. skulik przędziorkowiec		<b>Ortus 05 SC (10ml na 5-10l wody)</b>
owocówka śliwkóweczka	stosowanie pułapek z feromonami		<b>Mospilan 20 SP (2g na 5-9l wody)</b>
rdza śliwy	w pobliżu sadów niszczyć zawilca żółtego, drugiego żywiciela sprawcy rdzy śliwy		<b>Zato 50 WG lub Magnicur Gold 50 WG (1,5g na 7,5 l wody)</b>
dziurkowatość liści drzew pestkowych	systematycznie usuwać porażone pędy	wyciąg z krwawnika lub odwar ze skrzypu oraz gnojówka, wywar, napar bez rozcieńczenia ze chrzanu pospolitego	<b>Topsin M 500 SC (15ml na 7,5 l wody) lub Zato 50 WG lub Magnicur Gold 50 WG (1,5g na 7,5 l wody)</b>
brunatna zgnilizna drzew pestkowych	usuwanie porażonych pędów i mumii owoców	opryskiwanie wywarem (1:4) ze skrzypu polnego lub preparatem <b>EVASIOŁ</b> opartym na skrzypie polnym (50ml na 5 l wody), powtarzać co 10-15 dni	<b>Switch 62,5 WG (6-10g na 6-15l wody)</b>

Więcej: [Opryski śliw. Kiedy i czym przyskać śliwki od robaków i na choroby?](#)

Tu zamówisz: [środki ochrony do oprysku śliwek](#)

**PoradnikOgrodniczy.pl**  
Twój Ogród Piękny i Zdrowy