

Topas 100 EC - dawkowanie i terminy oprysków

Zwalczane choroby	Rodzaj upraw	Dawkowanie	Termin stosowania	Maks. liczba oprysków w sezonie	Min. odstęp między opryskami	Okres karencji
mączniak prawdziwy	jabłoń, grusza	1,25 ml w 5 l wody/100m ²	od początku fazy kwitnienia	3	10 dni	14 dni
mączniak prawdziwy, czarna zgnilizna	winorośl	0,8 - 3,2 ml w 4-16 l wody/100m ²	od fazy rozwoju 5 liścia do początku fazy dojrzewania jagód	4	10 - 14 dni	28 dni / 35 dni*
mączniak prawdziwy	pigwa	5 ml w 2-10 l wody/100m ²	od początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania owoców, termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji	3	10 dni	14 dni
amerykański mączniak agrestu	Agrest, porzeczka czarna, czerwona i biała	5ml w 2-10 l wody/100m ²	od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy zamierania roślin, termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji	2	7 dni	20 dni
mączniak prawdziwy	truskawka (uprawa polowa i pod osłonami)	5ml w 2-20 l wody/100m ²	od początku fazy tworzenia pędu rozłogowego do końca fazy zamierania roślin, termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji	2	10 dni	3 dni
mączniak prawdziwy	ogórek (uprawa polowa i pod osłonami)	5ml w 2-12l wody/100m ²	od początku fazy rozwoju kwiatostanów do końca fazy pełnej dojrzałości owoców, termin ostatniego zabiegu wyznacza okres karencji	3	8 dni	3 dni

Uwaga! Opracowano na podstawie etykiety środka Topas 100 EC do zastosowań amatorskich, aktualnej na dzień 19.05.2016. Przed zastosowaniem środka zawsze sprawdź aktualną etykietę załączoną do produktu. Źródło: target.com.pl

* dotyczy owoców do przetwórstwa

Więcej w naszym poradniku: [Topas 100 EC - zastosowanie, dawkowanie, cena](#)

Zamów w naszym sklepie: [Topas 100 EC - najlepsza oferta na rynku!](#)