

Wiosenne opryski porzeczek			
Zwalczana choroba/szkodnik	Ochrona chemiczna	Ochrona biologiczna, metody naturalne i ekologiczne	Uwagi
Przedwiośnie (luty-marzec, przed ruszeniem wegetacji)			
Szkodniki zimujące na pędach porzeczeki, w tym mszyce i przędziorki		Oprysk preparatami olejowymi Emulpar 940 EC (olej rydzowy) lub Promanal 60 EC (olej parafinowy)	Oprysk wykonać bardzo dokładnie, tak aby ciecz skapywała z pędów
Przed kwitnieniem (marzec-kwiecień)			
Krzywik porzeczkowiaczek, pryszczarek porzeczkowiak liściowy	Mospilan 20 SP		Oprysk wykonać maksymalnie 2 razy w sezonie, w fazie rozwoju kwiatostanu
Zamieranie pędów	Switch 62,5 WG		Oprysk do 3 razy w sezonie
Antraknoza (opadzina liści)	Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC, Switch 62,5 WG, Topsin M 500 SC, Zato 50 WG	Oprysk wyciągiem z czosnku bez rozcieńczania,	Oprysk do 2 razy w sezonie, Topsinem tylko 1 raz, Miedzianem do 3 razy
Przędziorek chmielowiec, Wielkopąkowiec porzeczkowy	Ortus 05 SC	Oprysk wyciągiem z czosnku lub z cebuli w rozcieńczeniu 1:1	
Kwitnienie (kwiecień-maj)			
Antraknoza (opadzina liści), biała plamistość liści	Topsin M 500 SC		
Szara pleśń	Switch 62,5 WG, Topsin M 500 SC	Polyversum WP	Zalecamy wybrać Polyversum WP (preparat biologiczny)
Mszyce		Emulpar 940 EC, mydło potasowe z dodatkiem czosnku, oprysk wywarem z czosnku lub z cebuli bez rozcieńczenia	Opryskać bezpośrednio po zaobserwowaniu kolonii mszyc na liściach, powtarzać co 7 dni aż do skutku
Zwójkówki i inne gąsienice objadające liście	Mospilan 20 SP	Oprysk naparem lub wywarem z krwawnika pospolitego, stosować bez rozcieńczania; oprysk wyciągiem z wrotyczu w rozcieńczeniu 1:2	Oprysk Mospilanem do 2 razy w sezonie, od momentu wylegania się młodych gąsienic do końca kwitnienia
Przędziorek chmielowiec, Wielkopąkowiec porzeczkowy	Ortus 05 SC	Oprysk wyciągiem z czosnku lub z cebuli w rozcieńczeniu 1:1	
Po kwitnieniu (maj-czerwiec)			
Antraknoza (opadzina liści), rdza wejmutkowo-porzeczkowa	Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC, Switch 62,5 WG, Topsin M 500 SC, Zato 50 WG	Na antraknozę oprysk wyciągiem z czosnku bez rozcieńczania, na rdzę oprysk wywarem ze skrzypu polnego w rozcieńczeniu 1:4 lub wyciągiem z bylicy piołun bez rozcieńczania	Oprysk po zauważeniu pierwszych objawów choroby

Szara pleśń		Polyversum WP	
Przędziorek chmielowiec	Ortus 05 SC	Emulpar 940 EC, oprysk wyciągiem z czosnku lub z cebuli w rozcieńczeniu 1:1	Ortus stosować do 2 razy w sezonie, ostatni zabieg na 21 dni przed zbiorami (okres karencji).
Mszyce		Oprysk naparem lub wywarem z krwawnika pospolitego, stosować bez rozcieńczania; oprysk wyciągiem z wrotyczu w rozcieńczeniu 1:2	Opryskać bezpośrednio po zaobserwowaniu kolonii mszyc na liściach, powtarzać co 7 dni aż do skutku
Szkodniki zjadające liście	Karate Zeon 050 CS	Oprysk naparem lub wywarem z krwawnika pospolitego, stosować bez rozcieńczania; oprysk wyciągiem z wrotyczu w rozcieńczeniu 1:2	Oprysk wykonać po zauważeniu licznych larw. Nie są niszczone gąsienice zwójek w zwiniętych liściach.

PoradnikOgrodniczy.pl
Twój Ogród Piękny i Zdrowy

Więcej: [Wiosenne opryski porzeczek. Czym przyskać porzeczeki na wiosnę?](#)

Zakup polecanych preparatów: [odwiedź nasz sklep ogrodniczy](#)

Ciąg dalszy terminarza oprysków:

[Jesienne opryski porzeczek. Czym przyskać porzeczeki po zbiorach?](#)